



Dextrometorfan – psychotropní látka v rukou dětí a adolescentů

MUDr. Gabriela Rábová¹, MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D.¹, PharmDr. Eliška Lacinová², MUDr. Lucia Kovářová³, doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.¹

¹Psychiatrická klinika FN Plzeň a LF UK v Plzni

²Klinika pracovního lékařství, Toxikologické informační středisko, 1. LF UK a VFN, Praha

³Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha

V posledních letech byl zaznamenán významný nárůst počtu osob zneužívajících dextrometorfan (DXM) pro jeho psychotropní účinky. DXM je obsažen v antitusicích (např. preparát Stopex®), která byla v České republice volně prodejná bez lékařského předpisu. Proto bylo snadné DXM získat a zneužívat. Od 15. 8. 2017 z důvodu rizika zneužívání byl po dohodě s držiteli registrace monokomponentních léčivých přípravků s obsahem DXM v pevné lékové formě změněn způsob výdeje. V České republice (ČR) je jejich výdej nadále možný pouze na lékařský předpis. V prvním pololetí 2017 jsme zaznamenali 5 případů zneužívání DXM u dětí a adolescentů hospitalizovaných na Dětském oddělení Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. V článku prezentujeme kazuistiku, která popisuje závažnou zkratkovou intoxikaci jedenáctiletého dítěte směsí léků, ve které nejpodstatnější složku představoval DXM v toxické dávce. Diskutován je kvantitativní trend nárůstu počtu nezletilých osob, které DXM zneužívají.

Klíčová slova: dextrometorfan, psychotropní efekt, škodlivé užívání, pediatriká populace, intoxikace.

KORESPONDENČNÍ ADRESA AUTORA: MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D., podlipny@fnplzen.cz
Psychiatrická klinika FN a LF UK v Plzni
Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň-Lochotín

Převzato z: *Pediatr. praxi.* 2018; 19(6): 337–339
Článek přijat redakcí: 1. 9. 2018
Článek přijat k publikaci: 5. 10. 2018