



formě (tablety, pastilky) pouze na lékařský předpis, byl nastaven trend poklesu počtu intoxikací DXM v ČR.

LITERATURA

1. Wagner JB, Pine HS. Chronic cough in children. *Pediatr Clin North Am.* 2013; 60(4): 951–967.
2. Boyer EW. Dextromethorphan abuse. *Pediatr Emerg Care.* 2004; 20(12): 858–863.
3. Burns JM, Boyer EW. Antitussives and substance abuse. *Subst Abuse Rehabil.* 2013; 4: 75–82.
4. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Minutes/2016/09/WC500213110.pdf
5. http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/Agendas_and_Minutes/Minutes/CMDh_Minutes_July_2016.pdf
6. <http://www.sukl.cz/leciva/rozhodnuti-ek-dohoda-cmdh-k-vysledkum-psusa-2016>
7. Pender ES, Parks BR. Toxicity with dextromethorphan-containing preparations: a literature review and report of two additional cases. *Pediatr Emerg Care.* 1991; 7(3): 163–165.
8. <http://www.sukl.cz/stopex-na-suchy-kasel-30-mg-tablety-a-meddex-vicks-pastilky>