



Disociativní zkušenosti a jejich psychometrické měření:

„Škála disociativních zkušeností“ a „Stavová škála disociace“

MUDr. Tereza Petrásková Toušková, Ph.D.¹, doc. RNDr. Petr Bob, CSc.¹

¹Centrum pro neuropsychiatrický výzkum traumatického stresu, Psychiatrická klinika a UHSL,
1. lékařská fakulta

Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova, Praha

Teorii disociace představil Pierre Janet jako poruchu asociačního systému v důsledku konfliktního traumatického nebo výrazně stresujícího prožitku s následnými projevy psychopatologických symptomů. Disociativní symptomy představují kontinuum vyskytující se i u zdravé populace a výraznějších projevů nabývají u závažných duševních poruch, jako jsou například disociativní poruchy. K posouzení nebo diagnostice disociativních symptomů byla publikována řada dotazníků a v našich podmínkách je již delší dobu používána škála disociativních zkušeností (DES) a somatoformní disociace (SDQ-20), které umožňují sledovat výskyt disociativních symptomů v delším časovém období. Dosud však u nás chybí psychometrický nástroj pro hodnocení momentálního stavu disociace jako reaktivní odpovědi na aktuální stresující situaci. Zde předkládáme pro použití čtenářům již validizovanou českou verzi dotazníku „Škála disociativních zkušeností“ (DES) a pro

KORESPONDENČNÍ ADRESA AUTORA: MUDr. Tereza Petrásková Toušková, Ph.D., ttouskova@aol.com
Centrum pro neuropsychiatrický výzkum traumatického stresu, Psychiatrická klinika 1. LF UK
Ke Karlovu 11, 128 00 Praha 2

Cit. zkr: Psychiatr. praxi 2021; 22(e3): e3–e14
Článek přijat redakcí: 16. 6. 2021
Článek přijat k publikaci: 18. 8. 2021